

Brussel, 29 juni 2026

Geachte collega's,

Resistente tuberculose - advies van de RR/MDR-TB-deskundigengroep (BELTA)

De behandeling van rifampicine-resistente tuberculose en (multi)resistente tuberculose (MDR-TB) vereist specifieke therapeutische keuzes en expertise.

BELTA (Belgian Lung and Tuberculosis Association), de wetenschappelijke overkoepelende organisatie van FARES en Respiratoire Gezondheid, coördineert sinds jaren een **RR/MDR-TB-deskundigengroep** waarin longartsen, infectiologen, kinderartsen, microbiologen, artsen uit de volksgezondheid en referentielaboratoria vertegenwoordigd zijn.

De klinische adviesraad probeert binnen de 48-72u een **behandeladvies** te formuleren - afhankelijk van de complexiteit van het dossier - op basis van de Belgische aanbevelingen en internationale richtlijnen.

Een beroep op de deskundigengroep wordt ten eerste aangeraden in de volgende situaties:

- in geval van **resistentie tegen rifampicine**
- voor elke patiënt met **DR-TB**
- bij **intolerantie voor eerstelijns tuberculostatica**
- of bij een **complexe of atypische TB** behandelingssituatie

Een behandeling met tweedelijns tuberculostatica kan enkel gestart worden **na goedkeuring** door deze klinische adviesraad gezien de kost van deze therapie volledig gedragen wordt door BELTA-TBnet.

Om een optimale zorg voor patiënten met TB - RR/DR of andere complexiteit – te garanderen raden we aan deze **aan het begin van de behandeling voor te leggen aan de deskundigengroep**.

Elk behandelende arts kan dit advies te allen tijde kosteloos aanvragen via BELTA op info@belta.be.

Wij danken u voor uw medewerking bij de toepassing van deze principes, die van essentieel belang zijn om een optimale en samenhangende behandeling van gevallen van resistente tuberculose in België te waarborgen.

Dr. Vinciane Sizaire
Directrice
BELTA - FARES

Dr. Wouter Arrazola de Oñate
Public Health Directeur
BELTA - Respiratoire Gezondheid